

Lane Medical Library

Aus der 1. medizinischen Abteilung
des Städtischen Krankenhauses München-Schwabing

SPONTANHEILUNG VON LUNGENABSZESSEN

INAUGURAL-DISSERTATION

verfaßt und einer hohen medizinischen Fakultät der Bayerischen

Ludwig-Maximilians-Universität München

zur Erlangung der medizinischen Doktorwürde

vorgelegt von

MAX LAGALLY

aus München

*

1 9 3 4

Gedruckt in der Graphischen Kunstanstalt Heinrich Schiele zu Regensburg

Referent:

Geheimrat Prof. Dr. H. Kerschensteiner

Tag der mündlichen Prüfung:

29. November 1934

Meinen Eltern gewidmet!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Lungenabzesse können entstehen im Anschluß an lobäre Pneumonien, Bronchopneumonien (bes. Grippepneumonien), durch aspirierte Fremdkörper, erbrochenen Mageninhalt, durch infizierte Embolien, Vereiterung von Infarkten und Lungentumoren, auch nach Brusttraumen und durch Übergreifen benachbarter Eiterherde.

Die klinische Diagnose ist in der Regel nicht schwierig, obwohl eine scharfe Trennung zwischen Lungenabszeß und Lungengangrän meist nicht möglich ist. Schon die Vorgeschichte liefert oft wertvolle Hinweise. Der Perkussions- und Auskultationsbefund, ein umschriebener Druckpunkt im Bereich der Infiltration (nach Sauerbruch), die meist erhöhte Temperatur im Verein mit dem fast immer sehr reichlichen eitrigen, gelegentlich hämorrhagischen, oft stinkenden Auswurf, der häufig elastische Fasern enthält, genügen als Kennzeichen; doch kommen auch nicht zu selten Fälle vor, in denen der Lungenabszeß durch lange Zeit keine typischen Beschwerden macht, das Sputum vollständig fehlt, und die Temperatur nur wenig oder auch gar nicht erhöht ist. Stets ist, auch nach röntgenologischer Untersuchung, differentialdiagnostisch an maligne Tumoren, tuberkulöse Kavernen, interlobäres Empyem, subphrenischen Abszeß und schließlich auch an eine Echinokokkusblase zu denken.

Die Prognose ist beim Lungenabszeß im Ganzen nicht ungünstig. Je mehr jedoch die putride Zersetzung in den Vordergrund tritt, um so gefährlicher wird der Zustand; doch sind auch bei ausgesprochener Gangrän die Heilungsaussichten nicht absolut schlecht, auch wenn nicht operiert wird.

Je nach der Verlaufsform ist die Prognose natürlich recht verschieden: Am günstigsten sind die Aussichten, wenn nur eine einzige schon abgekapselte Höhle besteht, bei der akuten, umschriebenen abszedierenden bzw. gangränösen Form, der sogenannten „heilbaren Form“ der französischen Autoren. Dabei kommt es oft zu Spontanheilung oder Übergang in chronische Formen, bei denen die Prognose quoad vitam verhältnismäßig gut

ist und Operation oft zur Heilung führt. Relativ gut sind die Aussichten auch noch bei den gewöhnlichen akuten Fällen von Gangrän, dagegen kommt nach Serio bei der chronisch rezidivierenden Form der Gangrän, der „heilbaren“ rezidivierenden Form Léon-Kindbergs, nur äußerst selten Ausgang in Heilung vor. Schlecht ist die Prognose bei fortschreitend gangränösem Lungenabszeß, besonders infolge der zahlreichen Komplikationen und der Schwächung des Allgemeinzustandes, und bei der akut rezidivierenden Form. Ganz schlecht sind die Aussichten schließlich bei allen den Fällen, die auf dem Boden eines Lungenkarzinoms oder durch Perforation eines Ösophaguskarzinoms entstanden sind, ebenso bei septischen Embolien.

In den letzten Jahren ist die Prognose sowohl durch die Fortschritte der Operationstechnik als auch besonders durch die der internen Behandlung ganz erheblich verbessert worden. So ergab z. B. eine Statistik der 1897 bis 1900 in den Berliner Krankenhäusern intern behandelten 133 Fälle von Lungengangrän 64,4 % Mortalität und 10—7,5 % Heilung. Dagegen bedeutete die erste Statistik Garrès im Jahre 1901 über 122 chirurgisch behandelte Fälle mit einer Mortalität von 34 % einen großen Fortschritt. 1910 veröffentlichte Kißling 122 operierte Fälle der Lenhartz'schen Abteilung mit 40,8 % Todesfällen, deren Zahl sich aber auf 26,8 % reduzierte, wenn er nur die Fälle berücksichtigte, bei denen die Pneumotomie richtig ausgeführt werden konnte und nicht von vornherein hoffnungslos war. Garrè konnte dann 1914 über 600 Fälle mit nur 17,5 % Mortalität berichten, und Sauerbruch zählte bis 1920 72 Fälle von Lungenabszeß mit 36 % Todesfällen und 37 Fälle von Lungengangrän mit 51 % Todesfällen.

Nun unterscheiden sich aber diese Ergebnisse von denen bei der heutigen internen Behandlung nicht so wesentlich, daß man in jedem Falle von Lungenabszeß und Lungengangrän die Operation empfehlen müßte. Vielmehr wird man sich heute selbst bei Gangrän viel lieber zu längerem Abwarten entschließen und zunächst in den meisten Fällen eine Salvarfan-Behandlung versuchen.

In der Tat sind die Erfolge bei interner Behandlungsweise zum Teil recht ermutigend, so erzielte Wester 33 %, Kully 40 %, Kindberg 20 % Spontanheilungen, auch bei Sauerbruch war der Prozentsatz ziemlich hoch. Meist handelte es sich in diesen Fällen um akute umschriebene Formen mit

einem einzelnen Eiterherd, der durch einen Bronchus entleert wurde. Nach Stähelin kann man jetzt bei rechtzeitiger interner Behandlung, wenn man die von vornherein hoffnungslosen Fälle ausschließt, mit einer Heilungsziffer von 50% und mehr und mit einer Sterblichkeit von 25% und weniger rechnen.

Der akute einzelne Lungenabszeß und eine Reihe von chronischen Abszessen sind in der Regel der konservativen medikamentösen Behandlung allein zugänglich (Spector), bei postpneumonischen Lungenabszessen wird man nach Nissen zunächst immer konservative Behandlungsmethoden anwenden, da ein großer Teil der Lungenabszesse nach Spontandurchbruch in den Bronchus ausheilt. Dabei sind die Aussichten auf Selbstheilung bei Oberlappeneiterungen günstiger als bei Unterlappeneiterungen. Sollte nach 6—8 Wochen keine Besserung eingetreten sein, dann wird operiert. Auch Nagel kommt zu dem Schluß, daß die operative Frühbehandlung des Lungenabszesses absolut nicht generell angebracht ist, vielmehr kann, wie die von ihm beschriebenen Fälle zeigen, erheblich länger bei interner Behandlung auf die Spontanheilung gewartet werden, als gewöhnlich angenommen wird. Nach Weitz ist auch schlechtes Allgemeinbefinden kein Hindernis, die innere Behandlung einzuleiten, die er für alle unkomplizierten Fälle empfiehlt, da Spontanheilung bei diesen nicht ausgeschlossen ist. Allerdings ist dabei genaue Röntgenkontrolle unerlässlich. Auf jeden Fall soll mit der Operation so lange gewartet werden, bis die Abszeßwand starr geworden ist. — Zweifellos gibt es auch Fälle, bei denen die angewandten Medikamente lediglich die Rolle von Adjuvantien spielen (Merklen und Gounelle), woran auch die Tatsache unbemerkt verlaufsener, daher auch unbehandelter Lungenabszesse denken läßt.

Die Indikation für die Operation sieht Stähelin in folgenden Fällen gegeben: Bei Durchbruch des Abszesses in die Pleurahöhle, mit eitrigem oder jauchigem Empyem oder Pneumothorax; bei Übergreifen einer Eiterung aus der Nachbarschaft; wenn eine größere Höhle besteht, die trotz langen Wartens nicht kollabiert und ausheilt; bei akutem Abszeß, wenn der Abszeß gut lokalisiert ist, und der Allgemeinzustand sich stetig verschlechtert; schließlich bei allen chronischen Formen.

Wenn operiert werden soll, dürfen keine multiplen Höhlen vorhanden sein, auch muß man die Lage des Herdes mit Sicherheit kennen. Denn es ist klar, daß bei einem Operieren an einer falschen Stelle der Schaden größer ist als bei einem Zuwarten von 2—3 Wochen, nach welcher Zeit eine Lokalisation fast immer möglich ist.

Das Hauptziel jeder Operation muß sein: Herbeiführung eines Kollapses und Drainage der Abzeßhöhle. Die Methoden, dieses Ziel zu erreichen, seien nur kurz erwähnt:

Voran steht die Pneumotomie — nach Refektion von einer bis mehreren Rippen Eingehen meist mit dem Thermokauter, sind die Pleurablätter nicht verwachsen, in zwei Sitzungen — mit Drainage der Abzeßhöhle, in manchen Fällen, besonders von putriden, chronisch gewordenen Abzessen und chronischer Pneumonie wird auch die meist partielle Pneumektomie angewandt, um den Infektionsherd völlig zu zerstören. Ferner wird häufig, besonders für ausgedehnte Prozesse mit unscharfer Begrenzung die Anlage eines Pneumothorax, auch mit Strangdurchbrennung empfohlen, wogegen von anderer Seite eingewandt wird, daß dadurch eine ev. später notwendige Pneumotomie sehr erschwert werden kann, wenn es nicht gelingt, die Pleurablätter zum Verwachsen zu bringen. Schließlich seien Phrenikotomie und Plombenbehandlung genannt, auch der Versuch, die Abzeßhöhle durch Punktion zu entleeren.

Bei der internen Behandlung von Lungenabzeß und Lungengangrän nimmt gegenwärtig die Chemotherapie einen breiten Raum ein; dabei steht im Vordergrund das Salvarfan, das in Deutschland erstmals 1914 von Brauer in Hamburg versucht wurde, um die mutmaßlichen Erreger, Spirochäten, abzutöten. Es hat, auch wenn diese Voraussetzung nicht zutreffen sollte, sicher eine spezifische Wirkung auf den Lungenprozeß. Nach Siebert ist der Erfolg dabei am günstigsten, wenn man große Salvarfandosen in möglichst kurzen Zeitabständen verabreicht (0,45—0,6 jeden 2. oder 3. Tag bis zur Gesamtmenge von 10 bis 12 g). Dann tritt am auffallendsten die gewünschte Wirkung ein: baldiges Fortbleiben des oft

sehr unangenehmen Foetor, Rückgang der Auswurfmenge, Temperaturabfall und Abnahme der Blutfenkungsgeschwindigkeit. Parifot und Cauffade stellten 1925 aus der Literatur 80 mit Salvarfan behandelte Fälle zusammen, bei denen 52 % geheilt, 16 % gebessert wurden und nur 25 keinen Erfolg erkennen ließen, so daß man nach Stähelin keinem Falle von Lungenabszeß oder Lungengangrän die Salvarfanbehandlung vorenthalten sollte.

In vereinzeltten Fällen wurde das Salvarfan auch direkt an den Eiterherd herangebracht. So beschrieb H. Edel einen Fall, bei dem im Anschluß an eine Kriegsverletzung durch ein Sprengstück in der Lunge ein foetider Abszeß entstanden war, der trotz zweimaliger Pneumotomie mit Extraktion von Sprengstücken bestehen blieb und erst durch mehrere Salvarfan-Injektionen mit steigenden Dosen in die Abszeßhöhle zum Schwinden gebracht werden konnte.

Das in letzter Zeit häufiger gebrauchte Emetin hat sich bei Abzessen, die durch die Ruhramöbe verursacht sind, fast als spezifisch wirkend erwiesen. Nach Fliederbaum in von 1—5 cg ansteigenden Dosen, nach Labbé in konstanten Dosen von 8 cg gegeben, führt es oft zur sofortigen Besserung: Die Temperatur wird normal, der Auswurf vermindert sich und verliert seinen widerlichen Geruch; der Allgemeinzustand, Appetit, Gewicht bessern sich. Röntgenologisch zeigt sich fortschreitende Vernarbung. Fliederbaum empfiehlt in den Fällen, in denen das Emetin zunächst verlag, mit intravenösen Injektionen von Novarsobenzol vorzubehandeln und am Schlusse der Kur Emetin anzuwenden.

Während Casparini der Ansicht ist, daß die Emetin-Behandlung nur bei Amöben - Abszessen eindeutig klinische Erfolge erzielt, kann nach Bernard auch bei nicht amöboiden foetiden oder nicht foetiden Lungenabszessen, besonders so weit es sich um frische Fälle handelt, rasche Heilung erreicht werden, bei älteren Fällen ist eine Beschleunigung der Heilung zu beobachten.

Auch Transpulmin und Solvochin werden in den bei Pneumonie üblichen Dosen häufig angewandt, in vielen Fällen mit sehr gutem Erfolg, schließlich Trypaflavin, Rivanol, Urotropin, je nach Lage des Falles allein oder kombiniert, auch zur Unterstützung der Salvarfanbehandlung.

Frühzeitige Injektionen von Alkohol (täglich 30—50 ccm einer

20%igen Lösung von absolutem Alkohol in physiologischer Kochsalzlösung intravenös) werden von Landau und Kaminer bei schweren, besonders postgrippalen Bronchopneumonien und bei akuten Lungenabzessen empfohlen, manchmal abwechselnd mit intramuskulären Injektionen von etwa 20 ccm Frischblut.

Zum Teil gute Resultate erzielt die Serotherapie. So sind von den 57 Fällen, die Parifot und Caussade gesammelt haben, 28% geheilt, 42% gebessert und 30% nicht beeinflusst worden. Es werden Seren gegen die verschiedensten Arten von Bakterien hergestellt; auch mit polyvalenten Seren und Kombinationen von Seren wird gearbeitet. Der Erfolg tritt im allgemeinen nach der 3.—4. Injektion im Laufe einer Woche ein; in vielen Fällen ist allerdings keine spezifische Wirkung des Serums zu beobachten.

Neben der eigentlichen medikamentösen Therapie hat die interne Behandlung die Aufgabe, den Allgemeinzustand zu erhalten, die Infektion zu bekämpfen, die putride Zersetzung zu vermindern und den Abfluß des Sekrets zu erleichtern. Ersteres wird in der Hauptsache erreicht durch kräftige Ernährung (Milch, Eier, Butter, Lebertran, Nährpräparate); wichtig ist es in diesem Zusammenhang auch, die Höhe des Blutzuckerspiegels zu überwachen und gegebenenfalls durch Infulingaben zu beeinflussen, wodurch sich nach Lebße die Heilungstendenz oft außerordentlich steigern läßt. Gegen starken Husten und Schmerzen sind Narkotica zu geben.

Neuerdings wird von Machold der Versuch empfohlen, die Abwehrkräfte des angegriffenen Körpers durch Omnadin zu steigern, das sie in erhöhtem Reizzustand versetzt und es auch ermöglicht, der Forderung nach der Bekämpfung der unbekannten Erreger nachzukommen. An Hand von sechs Krankheitsfällen wird die günstige Wirkung der Omnadinbehandlung geschildert: baldige deutliche Besserung des subjektiven Befindens, des Appetites und Pulses, Fiebersenkung und Abnahme des Auswurfes nach wenigen Injektionen.

Die Zersetzung des Eiters zu vermindern und den Abfluß des Sekrets zu erleichtern helfen die Balsamica und Antiseptica, von denen eine ganze Anzahl zum Teil auch injizierbarer Präparate im Gebrauch ist, wie Knoblauch, Eucalyptol, Myrtol, Menthol, Terpentin, Creosotal, Anaftil usw. Von Bonem werden intravenöse Injektionen von Pulmothymol empfohlen, einer

wässrigen, kolloidalen 1%igen Lösung von Menthol-Thymol, das meist momentan, jedenfalls aber im Verlauf von 24 Stunden eine kräftige Expektoration erzielt und den foetiden Geruch in einigen Tagen verschwinden läßt. Doch auch Wickel sowie Umschläge mit Enelbin vermögen die Expektoration kräftig anzuregen und dem Kranken große Erleichterung zu schaffen.

Schließlich sei noch eine Reihe besonderer Methoden genannt: Zunächst die Durstkur nach Singer, ferner ist, hauptsächlich bei Fällen mit röntgenologisch scharfer Demarkation und Abfluß nach dem Bronchus, ein Versuch mit der Quincke'schen Drainagelagerung zu machen. Dabei ist es natürlich nicht damit getan, daß man das Fußende des Bettes erhöht, sondern der Kranke muß auch eine bestimmte, für ihn besonders günstige Körperhaltung einnehmen, die er meist selbst bald herausfindet.

Hjafchenko empfiehlt intratracheale Einblasungen von Arzneilösungen, meist Guajacol, Eucalyptol usw., mit denen er in mehreren Fällen gute Erfolge hatte, von anderer Seite wird der Versuch gemacht, die Abszeßhöhle durch Absaugung mit dem Bronchoskop zu entleeren.

Günstigen Einfluß sah Schliephake bei embolisch entstandenen, auch multiplen Lungenabszessen von Ultra-Kurzwellen: Bereits nach zwei Durchflutungen mit einer 12 m-Welle war der üble Geruch und Auswurf verschwunden, Heilung trat nach einigen weiteren Befundungen im Verlauf weniger Wochen ein.

Hier sei schließlich noch erwähnt, daß an hiesiger Abteilung nicht ungünstige Ergebnisse mit dem auch zur Empyembehandlung mehrfach erfolgreich angewandten künstlichen Terpentinsabszeß — Anlage durch Injektion von 1—2 ccm reinen Terpentinöls subkutan — erzielt werden konnten.

Von den in den Jahren 1925—1934 auf der I. medizinischen Abteilung des Krankenhauses Schwabing beobachteten 28 Fällen von Lungenabszeß, abszedierender Pneumonie und Lungengangrän wurden 8 auf die chirurgische Abteilung verlegt. Von diesen sind 5 gestorben. 20 Fälle wurden auf der inneren Abteilung behandelt; davon konnten 9 zur vollständigen Heilung gebracht werden, darunter wiederum 8 ohne größeren Eingriff.

Bei den 11 ad exitum gekommenen Kranken handelte es sich in sieben Fällen um Gangrän bzw. ausgedehnte abgediegender Bronchopneumonien, in einem Falle um eine retentionspneumonische Infiltration mit großer Abszeßbildung infolge eines stenosierenden Bronchialkarzinoms, ein Patient kam nach langer internistischer Behandlung, bei der der Abszeß nicht zum Verschwinden zu bringen war, später zur Operation und starb an einer Luftembolie. Zwei Fälle betrafen alte, abgekapselte Lungenabszesse, die während der Beobachtung klinisch keine Erscheinungen gemacht hatten und erst bei der Sektion als Nebenfund bekannt wurden.

Die unter rein interner Behandlung geheilten Fälle sollen nun im Folgenden geschildert werden:

I. 48jähriger Mann, der 7 Wochen vor der Einweisung ins Krankenhaus an Pneumonie des rechten Unterlappens mit Pleuritis erkrankte. Unter intensiver Behandlung mit Transpulmin und Chinin ging die Temperatur endlich nach 5 Wochen zur Norm zurück. Doch bestand seitdem Husten und Auswurf; nach einigen fieberfreien Tagen erneuter Temperaturanstieg, Abgeschlagenheit. Fünf Tage vor dem Eintritt wurden in 24 Stunden etwa 400 ccm gelblich-grünliches, schleimiges Sputum ausgehustet, bei flachem Liegen mehr als im Sitzen.

Bei der Untersuchung des kräftig gebauten, noch in gutem Ernährungszustand befindlichen, aber sehr blassen Mannes, findet sich die rechte vordere Lungengrenze unverschieblich in der Höhe der Mamille, hinten unten besteht eine handbreite, nicht durchschlagbare Dämpfung. Das Atemgeräusch ist rechts vorne leise, rein, rechts hinten unten aufgehoben. — Auf der Röntgenaufnahme findet sich ein intensiver Schatten in den hinteren Partien, halbbirnförmig nach vorn scharf abgesetzt, in seinem oberen Teil ein halbhühnerei-großer Aufhellungsbezirk.

Eine Durchleuchtung am nächsten Tage zeigt in diesem Aufhellungsbezirk einen Flüssigkeitspiegel, der sich stets horizontal einstellt. Damit ist der Verdacht auf Lungenabszeß bestätigt.

Die Sputummengen wechselten in den ersten Tagen zwischen 150 und 300 ccm; dabei stieg das Fieber bei geringer Menge bis 39° C. Im Sputum konnten nie Tuberkelbazillen nachgewiesen werden. Die Blutfärbung

geschwindigkeit war stark beschleunigt: nach einer Stunde: 65; nach zwei Stunden: 98. Im Blutbild eine beträchtliche Linksverschiebung (16% Stabkernige) bei 10320 Leukozyten.

Man entschloß sich vorerst für interne Behandlung und gab Neo-Salvarsan und Creosotal. Darauf besserte sich das Befinden im Laufe von 14 Tagen erheblich. Die Infiltration wie auch die Abzeföhle nahmen an Größe ab, die Auswurfmenge wurde geringer. Die Temperatur war nur noch wenig erhöht, das Blutbild wies noch 7% Stabkernige bei 12480 Leukozyten auf.

Nach weiteren drei Wochen ist Patient außer Bett. Das Röntgenbild zeigt noch eine leichte diffuse Verschattung in den hinteren und unteren Partien der rechten Lunge; eine Spiegelbildung ist nicht mehr nachzuweisen. Der Auswurf ist ganz verschwunden, die Temperatur und die Blutlenkung normal, im Blut finden sich noch 7440 Leukozyten. Acht Tage später wird Patient geheilt entlassen.

Bei einer Nachuntersuchung nach einem Landaufenthalt von sechs Wochen ist Befinden und Aussehen sehr befriedigend. 4,5 kg Gewichtszunahme. Kein Husten mehr. Über der ganzen rechten Lunge besteht noch eine leichte Schallverkürzung, die Grenzen sind wenig verschieblich (Verschwartung nach Pleuritis diaphragmatica). Das Atemgeräusch ist noch etwas leiser als links. Keine Rasselgeräusche. Röntgenologisch ist das rechte Lungenfeld weitgehend aufgeheilt.

Einen ganz anderen Verlauf zeigt der folgende Fall:

II. 45jähriges Dienstmädchen wird wegen Magenbeschwerden eingewiesen, die seit etwa einem Vierteljahr bestehen, nachdem es schon vor einem Jahr an denselben Beschwerden und Gallbrechen gelitten hatte. Jetzt bestehen keine eigentlichen Schmerzen, aber große Unruhe. Patientin ist wenig, doch bleibt das Gewicht konstant; der Stuhlgang ist regelmäßig.

Die Untersuchung zeigt eine blasse, nicht sehr kräftig gebaute Frau in eben noch genügendem Ernährungszustand. Flacher, asthenischer Brustkorb; Brustbein leicht eingefunken. Die Lungengrenzen sind gehörig und verschieblich; perkutorisch kein besonderer Befund, überall Bläschenatmen. Im Abdomen kann eine krankhafte Veränderung nicht nachgewiesen wer-

den. Die Temperatur ist normal, die Blutfenkung: 19 in einer, 35 in zwei Stunden. Im Blutbild 76% Polynucleäre, 21% Lymphozyten, 3% Übergangsformen bei 7350 Leukozyten.

Die Patientin hustete ein wenig; deshalb wurde eine Röntgenaufnahme gemacht: Sie ergab dem rechten Hilus aufsitzend eine sehr dichte, scharf begrenzte Verschattung, die sich in den mittleren Teilen nach dem 3. ICR rechts vorne zu in feine Streifen auffasert. Unmittelbar nach der Aufnahme erfolgte ein sehr starker Hustenanfall mit Entleerung von reichlich schleimig-eitrigem Auswurf. Sofort wurde eine weitere Aufnahme gemacht, die die Verschattung im rechten Hilus etwas aufgehellt zeigte, seitlich war in den vorderen Partien oberhalb des Herzschattens eine etwa pflaumengroße, durch Luft aufgehellte Zone mit Spiegel am unteren Pol zu sehen, der sich im Liegen horizontal einstellte. Dem oberen Pol des Aufhellungsbezirkes war noch eine kleinere pilzförmige Aufhellung angeschlossen.

Von jetzt an wurde reichlich Sputum ausgehustet, das zugrundegehende polynucleäre Leukozyten, daneben Epithelien, zahlreiche Kokken und Stäbchen, aber keine Tuberkelbazillen enthielt. Die Diagnose Lungenabszeß war damit gesichert.

Sofort wurde eine Salvarfan-Kur begonnen und im Laufe von 6 Wochen 4,5 gr Neo-Salvarfan injiziert. Zur Unterstützung der Expektoration wurde Creofotal gegeben. Darauf erholte sich die Patientin gut, die Blutfenkung wurde normal, der Husten und Auswurf geringer. Eine Röntgenaufnahme nach 14 Tagen ließ die Aufhellungshöhle hinter dem Sternum kleiner erscheinen.

Doch nun kam die Besserung zum Stillstand. Auch nach zwei Monaten war die Verschattung mit dem Aufhellungsbezirk unverändert nachzuweisen. Immer noch trat von Zeit zu Zeit Husten mit Auswurf auf; die Senkung war beschleunigt, doch die Temperatur normal. Da eine weitere Besserung auf dem bisherigen Wege nicht zu erwarten war, und die Patientin eine Operation ablehnte, wurde sie nach Hause entlassen.

Nach 13 Monaten kam sie wieder zur Behandlung. Sie hatte sich in der Zwischenzeit nie ganz wohl gefühlt, hatte immer an ihren unklaren Magenbeschwerden gelitten und alle paar Tage einen heftigen Hustenanfall mit schleimig-eitrigem Auswurf gehabt. Dabei war der Hustenreiz oft so

stark geweien, daß sie erbrechen mußte. Zuletzt bekam sie im Anschluß an einen starken Hustenanfall Schmerzen auf der Brust, die nur langsam schwächer wurden. Im Auswurf waren Blutfäden zu sehen gewesen.

Der Befund war ähnlich wie früher: Die Patientin war blaß, in mäßigem Ernährungs- und Kräftezustand, sehr nervös. Die Temperatur war normal. Röntgenologisch war der gleiche Abzeß wie früher im rechten Mittellappen zu erkennen. Da er deutlich abgesetzt und sicher verschwartet war, erschien eine operative Freilegung leicht möglich. Patientin war jedoch zu einer Operation nicht zu bewegen. Nun wurde therapeutisch Transpulmin gegeben. Darauf besserte sich das Allgemeinbefinden wieder, Husten und Auswurf wurden weniger, das Gewicht nahm zu.

Als sich die Patientin nach 2 Monaten doch zur Operation entschloß, wurde noch einmal eine Röntgenaufnahme gemacht, auf der jedoch nur noch eine sich vom Hilus zum Brustbein erstreckende gleichmäßige Trübung zu sehen war; eine Aufhellung oder ein Spiegel waren nicht mehr nachweisbar.

Der Abzeß war also als geheilt zu betrachten. Dem entsprach auch der übrige Befund: Die Temperatur war normal, der Husten blieb ganz aus. Blutsenkungsgeschwindigkeit: nach einer Stunde 16, nach zwei Stunden 24; im Blut 4300 Leukozyten.

Einen viel schwereren, dabei jedoch auch schnelleren Verlauf zeigen die beiden nächsten Fälle:

III. 55jähriger Mann, der früher wiederholt schwere Lungenentzündungen durchgemacht hat. Er hatte sein ganzes Leben lang mit starkem Husten und mit Bronchitis zu tun. Etwa 3 Wochen vor dem Eintritt fühlte er sich wieder krank, doch hatte er damals eine Eiterung am linken Unterarm und führte darauf alles zurück. Dann bekam er Schüttelfrost; die Temperatur stieg an. Auffällige Nachtschweiße hatte er nicht. Nach einiger Zeit trat Husten mit stinkendem Auswurf auf; die Temperatur stieg erneut an. Das Fieber ging zwar nach einigen Tagen wieder zurück, doch hatte er von da an Schmerzen in der rechten Brustseite, die nur langsam schwächer wurden. Dann nochmals erhöhte Temperatur und stinkender Auswurf.

Es handelt sich um einen großen, blassen Patienten; sehr reduzierter Ernährungs- und Kräftezustand. Über der Lunge besteht Schallverkürzung rechts hinten unten paravertebral. An dieser Stelle leicht vermehrter Pectoralfremitus, geringe Bronchophonie, sowie fernklingende Rasselgeräusche. Das Röntgenbild zeigt eine zwei Querfinger breit beginnende Verschattung, die sich dem rechten Herzrand anlagert und sich nach unten verbreitert, oberhalb des Zwerchfells aufhellt und teilweise in Streifenzeichnung auflöst. Blutsenkung: nach einer Stunde 91, nach zwei Stunden 121. Blutbild: Jugendliche 1%, Stabkernige 5%, Polynucleäre 66%, Eosinophile 2%, Lymphozyten 28% bei 12 400 Leukozyten.

Klinisch bestand zunächst Verdacht auf Lungentumor, röntgenologisch lag eher eine atypische (ev. tuberkulöse) Pneumonie nahe. Das Sputum war jedoch immer frei von Tuberkelbazillen. Wegen des stinkenden Sputums war besonders an einen Lungenabszeß zu denken. Es wurde mit Neo-Salvarfan-Injektionen begonnen, daneben wurde Mixt. Ipecac. gegeben. Darauf langsame stetige Besserung des klinischen und des Röntgenbefundes. Der stinkende Auswurf verschwand; Patient konnte nach 5 Wochen in ambulante Behandlung entlassen werden. Klinisch und röntgenologisch waren die Erscheinungen stark zurückgegangen, doch befanden sich im Blut noch 11 160 Leukozyten, auch die Senkungsgeschwindigkeit war noch erhöht: nach 1 Std. 12, nach 2 Std. 36.

Eine Nachuntersuchung 6 Wochen nach der Entlassung ergab klinisch keinen krankhaften Befund mehr, auf dem Röntgenbild war kein Infiltrat mehr nachzuweisen. Doch bestand noch immer eine etwas beschleunigte Senkung von 8 in der ersten, 16 in der zweiten Stunde und eine Leukozytenzahl von 10 920.

Anscheinend hat es sich hier trotz aller anfänglichen Zweifel doch um eine abszedierende zentrale Pneumonie rechts gehandelt, auf deren Entstehung die Eiterung am linken Unterarm sicher nicht ohne Einfluß gewesen ist. Auch im nächsten Fall scheint die Annahme einer metastatischen Eiterung nicht unberechtigt zu sein:

IV. 52jähriger Mann, der 4 Wochen vor der Aufnahme eine Angina bekam, die in Tonsillarabszeß überging. Incision. Nach der Abheilung

blieb die Temperatur zwischen 37 und 39° C, es bestand große Abgeschlagenheit, Husten und wenig Auswurf. 3 Wochen später hoher Temperaturanstieg, vermehrter Husten, grau-schleimiger Auswurf. Nach weiteren 8 Tagen bekam Patient morgens heftige Hustenanfälle, bei denen innerhalb zweier Stunden etwa $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Liter stinkende, gelbliche eitrigte Massen ausgehustet wurden. Darauf erfolgte Einweisung.

Mittelgroßer, stark fiebernder Mann in mäßigem Ernährungs- und Kräftezustand. Mandeln und Rachen sind etwas gerötet. Über der linken Lunge besteht eine Schallverkürzung bis fast zur Spitze mit Bronchialatmen und einzelnen klingenden Rasselgeräuschen, röntgenologisch findet sich ein besonders intensiver Schatten in den hinteren Partien mit einem Spiegel, über dem eine Luftblase von etwa Halbpapfelgröße zu sehen ist.

Darauf wurde die Diagnose Exsudat mit Abszeß in den hinteren unteren Partien der linken Lunge gestellt. Die Blutsenkung war stark beschleunigt: nach 1 Std. 51, nach 2 Std. 102. Im Blutbild bei 20 000 Leukozyten eine beträchtliche Linksverschiebung: 4% Jugendformen, 8% Stabkernige, 73% Polynucleäre, 7% Lymphozyten, 7% Mononucleäre und 1% Eosinophile.

Schon weil bei dem Patienten wegen seines schlechten Gesamtzustandes eine Operation sicher zum Exitus geführt hätte, wurde eine konservative Behandlung versucht. Punktiert mußte nur einmal werden. Das Exsudat ergänzte sich wieder und bewirkte eine entsprechende Kompression, um sich dann langsam zu reforbieren. Behandlung mit Enelbin-Umschlägen und einer Salvarfan-Kur brachte langsame, aber stetige Besserung. Schon nach kurzer Zeit wurde kein stinkendes Sputum mehr ausgehustet. Es entleerte sich, durch Hängelage begünstigt, reichlich zäh-schleimiges Sekret. Der Hustenreiz wurde leichter, zuletzt bestand fast gar keiner mehr. Die Temperatur fiel zu normalen Werten ab. Besserung des Gesamtzustandes mit anhaltender Gewichtszunahme. Gleichmäßige Besserung auch des Blutbildes, Absinken der Leukozytenzahl bis zur Norm, ebenso der Blutsenkungswerte. Im Sputum waren nie Tuberkelbazillen nachzuweisen. Patient konnte nach 10 Wochen aufstehen und nach 12 Wochen geheilt nach Hause entlassen werden. Klinisch bot sich noch der Befund einer Pleurafschwarte, röntgenologisch war die linke Lunge noch etwas weniger lichtdurchlässig als die rechte.

Eine Nachuntersuchung nach 17 Monaten ergab bestes Befinden bei einer Gewichtszunahme von 17 kg. Auf der Lunge bestand links hinten unten eine handbreite Schallverkürzung. Blutfärbung: nach 1 Std. 1, nach 2 Std. 4.

Während sämtliche bisher geschilderten Fälle mit Salvarsan behandelt worden waren, wurde bei den folgenden der günstige Erfolg in der Hauptsache mit Transpulmin und Emetin unter Hinzunahme der physikalischen Methoden, in einem Falle auch mit diesen allein erzielt:

V. 43jähriger Mann, der 16 Tage vor der Aufnahme an einer Halsentzündung erkrankte, aus der sich ein Tonsillarabszeß rechts entwickelte, der sich spontan entleerte. Nach wenigen Tagen entstand auch auf der linken Seite ein Tonsillarabszeß, der sich jedoch ebenfalls spontan entleerte, worauf die Temperatur allmählich auf 37,5° C herunterging. Nun klagte aber Patient in der letzten Nacht über Stechen im Rücken und etwas Atemnot. Diese wurde dann anfallsweise sehr stark. Einweisung.

Großer, kräftig gebauter Mann von schwerkrankem Aussehen, hochfiebernd und benommen. Die linke Mandel ist geschwollen, vorspringend, ohne Belag und ohne Geschwür, die rechte ist weniger vergrößert. Die rechte hintere Lungengrenze steht etwas höher als die linke, das Atemgeräusch ist rechts hinten etwas abgeschwächt. In den nächsten Tagen bildet sich über der rechten Lunge von der Mitte der Scapula abwärts eine Dämpfung aus, über der Bronchialatmen mit feinblasigem Rasseln zu hören ist. Röntgenologisch ist die rechte Seite diffus getrübt, intensiv in den unteren Partien hinten, wo sich eine handbreite Verschattung findet, die nach oben allmählich heller wird. Es besteht wechselnde Temperatur um 39° C, Husten mit eitrigem Auswurf in verschiedener Menge, der keine Tuberkelbazillen enthält. Die Senkung ist sehr stark beschleunigt: 100 nach der ersten, 115 nach der zweiten Stunde; im Blutbild bei 17 050 Leukozyten 24% Stabkernige, 66% Polynucleäre, 4% Monozyten, 1% Basophile und 5% Lymphozyten.

Therapeutisch wurden Wickel, Transpulmin, Campfer, Mixt. solvens, später Emetin gegeben. In den nächsten 4 Wochen blieben die ungleichmäßigen Temperaturen um 39° C fortbestehen. Der Patient magerte stark

ab. Es bestand Husten, bei dem wenig Auswurf gefördert wurde, doch wurden scheußlich stinkende eitrige Stühle entleert, die sicher das massenhafte, immer verschluckte Sputum enthielten. Der klinische Lungenbefund änderte sich nicht; röntgenologisch konnten keine Abzeßhöhlen nachgewiesen werden, doch wurde die Diagnose abgedringende Pneumonie nach den übrigen Symptomen gestellt. Nach 4 Wochen war die Senkung noch außerordentlich stark beschleunigt: nach einer Stunde 114, nach zwei Stunden 135, das Blutbild zeigte 35% Stabkernige, 37% Polynucleäre, 28% Lymphozyten, 1% Monozyten, 1% Basophile bei 15 700 Leukozyten.

Die folgenden 4 Wochen brachten eine auffallende Besserung des Allgemeinzustandes mit Gewichtszunahme. Die Temperatur hielt sich mit Ausnahme einiger Zacken, die wohl auf Sputumretention zurückzuführen sind, immer um 37° C. Der klinische Lungenbefund blieb unverändert, röntgenologisch wurde ein rundlicher Aufhellungsbezirk etwa handbreit oberhalb des Zwerchfells sichtbar.

10 Wochen nach der Aufnahme war Patient völlig beschwerdefrei und konnte aufstehen. Die Temperatur war normal, Husten und Auswurf bestanden nicht mehr, über der Lunge nur noch eine 3 Querfinger breite intensive Dämpfung rechts hinten unten mit Bronchialatmen und klingenden Rasselgeräuschen. Die Senkung war noch etwas beschleunigt: 18 nach einer, 57 nach zwei Stunden. Patient nahm gut an Gewicht zu und konnte nach weiteren 14 Tagen zur Nachkur entlassen werden.

VI. 19jähriger Patient erkrankte etwa 8 Tage vor der Einweisung mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Stechen im Rücken, Husten und großer Mattigkeit.

Es handelte sich um einen großen, kräftig gebauten jungen Mann, der sehr schwer krank ausah und etwas benommen war. Die Temperatur hielt sich über 40° C. Über der Lunge fand sich rechts hinten unten in einem Bezirk von Handtellergröße eine beträchtliche Dämpfung mit Bronchialatmen und zahlreichen klingenden und nichtklingenden Rasselgeräuschen. Es erfolgte häufiger Husten mit spärlichem, schleimig-eitrigem Auswurf.

Unter Wickeln und Inhalation besserte sich im Laufe von 8 Tagen das

subjektive Befinden sehr, die Temperatur kehrte zur Norm zurück. Gleichzeitig trat sehr viel eitriges Sputum auf, das keine Tuberkelbazillen enthielt. Die Schallverkürzung über der Lunge hellte sich auf, das Atemgeräusch nahm wieder vesiculären Charakter an. Dabei bestanden sehr reichlich Rasselgeräusche. Eine Röntgenaufnahme ergab eine intensive Verschattung in den mittleren Partien rechts mit Verdacht auf eine Einschmelzungszone. Nun wurde die Diagnose abzedierende Grippe-Pneumonie gestellt.

14 Tage später fand sich über der Lunge klinisch nur noch eine geringe Schallverkürzung rechts hinten unten mit ziemlich viel Rasselgeräuschen, röntgenologisch in den mittleren Partien der rechten Lunge streifig-fleckige Trübung. Husten und Auswurf waren noch reichlich vorhanden. Patient fühlte sich im allgemeinen wohl und hatte guten Appetit.

Die nächsten 3 Monate brachten langsame, stetige Besserung des Gesamtzustandes und gute Gewichtszunahme. Die Temperatur blieb normal. Husten und Auswurf wurden immer spärlicher und verschwanden schließlich ganz. Patient konnte dann in ein Erholungsheim entlassen werden. Klinisch war über der Lunge kein krankhafter Befund mehr zu erheben; das Röntgenbild zeigte Reste einer Infiltration rechts unten.

VII. 58jähriger Mann, der vor mehreren Wochen an Mattigkeit und Übelsein erkrankte; er bekam Atembeschwerden, mußte dauernd husten, wobei er Stiche in der linken Brustseite verspürte. Der Husten förderte zähen, weißen Schleim heraus. Der Appetit ließ stark nach; beträchtliche Gewichtsabnahme.

Die Untersuchung zeigt einen mittelgroßen Mann in sehr reduziertem Ernährungszustand. Temperatur 38° C. Klinisch sind über der Lunge in der Hauptfläche bronchitische Geräusche zu hören, daneben in einem kleinen Gebiet mit abgeschwächtem Klopfeschall über dem rechten Hilus verschärft Bläschenatmen. Dagegen zeigt die Röntgenaufnahme in den lateralen Partien des linken Oberlappens eine etwa apfelgroße intensive, relativ scharf begrenzte Verschattung, in deren Mitte einen unscharf gekammerten Aufhellungsbezirk. Die Senkung ist stark beschleunigt: 60 in der ersten, 104 in der zweiten Stunde. Es besteht Husten mit reichlich Auswurf, der

Kokken und massenhaft Leukozyten, aber keine Tuberkelbazillen enthält. Danach ist die Diagnose Lungenabszeß sehr wahrscheinlich.

Unter Ruhe, Wickeln, Inhalation, Transpulmin, Emetin, Jodkali gingen die anfänglichen Temperaturen und das Sputum langsam zurück; die physikalischen Symptome über der rechten Lunge waren nie besonders ausgeprägt, die bronchitischen Geräusche klangen allmählich ab. Röntgenaufnahmen zeigten deutlich die Aufsaugung des Infiltrates. Die Senkung blieb jedoch noch lange sehr beschleunigt. Patient wurde nach viereinhalb Wochen auf seinen eigenen Wunsch subjektiv und objektiv weitgehend gebessert entlassen.

Zum Schluß sei ein Fall beschrieben, bei dem es gelang, die Abszeßhöhle durch einmalige Punktion zu entleeren und dann schnell vollständige Heilung zu erzielen:

VIII. 44jähriger Mann erkrankte 3 Wochen vor der Krankenhausaufnahme plötzlich mit Frösteln, Husten und Fieber zwischen 38 und 39° C. Die Temperatur fiel dann allmählich ab, es erfolgte aber keine völlige Entfieberung. Nach 14 Tagen ging die Temperatur wieder in die Höhe, gleichzeitig wurde stinkender Auswurf entleert. Einige Tage später wurde noch einmal übelriechendes Sputum ausgehustet. Jetzt stellte der Arzt eine Dämpfung links hinten unten fest. Darauf erfolgte Einweisung ins Krankenhaus.

Großer, kräftig gebauter Mann in gutem Ernährungszustand, der über Mattigkeit, Husten, Stechen in der linken unteren Brustgegend klagte. Die Temperatur bewegte sich um 39° C. Patient hustete schleimig-eitriges Sputum aus, das frei von Tuberkelbazillen war. Über der Lunge fand sich links hinten unten eine etwa 2 Querfinger breite Dämpfung. Dort waren klingende, großblasige Rasselgeräusche zu hören; das Atemgeräusch war abgeschwächt. Die Röntgendurchleuchtung zeigte eine Verschattung über dem linken Zwerchfell, die sich bei leichter seitlicher Drehung in einen dichten rundlichen wandständigen Teil und einen weniger dichten, mehr diffusen Schatten teilte.

Da das Fieber ständig in die Höhe ging und der Patient sehr matt wurde, wurde wegen der günstigen Lage der Infiltration an der Stelle

der Dämpfung punktiert und sofort rahmiger Eiter, danach etwas Blut gewonnen. Der Eiter enthielt keine Tuberkelbazillen. Nach der Punktion hatte Patient einen Schüttelfrost, doch war am nächsten Tage das Fieber wieder bis 38° C. abgefallen. Auch jetzt bestand eine etwa 4 cm breite Dämpfung links hinten unten, über der abgeschwächtes Bronchialatmen und feinblasige klingende Rasselgeräusche zu hören waren. Im Auswurf befand sich etwas hellrotes Blut.

Acht Tage später war die Temperatur kaum mehr erhöht, die Dämpfung fast geschwunden, das Atemgeräusch darüber nur noch leicht abgeschwächt. Nur mehr wenig Rasselgeräusche. Der Husten war ganz spärlich geworden, der Auswurf sah jetzt rostfarben aus. In den nächsten acht Tagen wurde die Temperatur normal; Husten und Auswurf verschwanden ganz. Über der Lunge nur noch eine minimale Schallverkürzung links hinten unten außen, keine Rasselgeräusche.

Nach einer weiteren Woche konnte Patient völlig beschwerdefrei entlassen werden. Eine nochmalige Röntgenaufnahme zeigte nur noch einen ganz kleinen Schwartenschatten links unten außen.

Abschließend ist festzustellen, daß bei der internen Behandlung von Lungenabszessen mehrere von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehende Methoden erfolgreich angewandt wurden. Allen beschriebenen Fällen gemeinsam ist, daß es schließlich zum Durchbruch der Abszeßhöhle in den Bronchus kam, womit der wohl einzige Weg der Spontanheilung beschritten wurde. Daran schloß sich dann die Periode der Drainage und Schrumpfung der Höhle, die je nach der Verlaufsform und der Schwere des Prozesses verschieden lange Zeit bis zum völligen Verschwinden aller Krankheitsercheinungen benötigte.

Literaturverzeichnis.

- Handbuch der inneren Medizin, II, 2.
Lehrbuch der inneren Medizin, Bergmann usw.
Domarus, Grundriß der inneren Medizin.
Garrè-Borchard, Lehrbuch der Chirurgie.
Sauerbruch, Chirurgie der Brustorgane.
F. Serio, Der gangränöse Lungenabzefß. Ergebnisse d. inn. Med. 42.
F. Nagel, Zur Behandlung der Lungenabzefße. D. m. W. 1931, Nr. 44.
P. Siebert, Fortschr. d. Ther. 8.
W. Weitz, Zur Behandlung des Lungenabzefßes und der Lungengangrän. Med. Klinik 1933, Heft 31.
M. Lebsche, Die Behandlung des Lungenbrandes. Mü. med. Wschr. 1932, Nr. 15.
K. Machold, Zur Behandlung des Lungenabzefßes. Mü. med. Wschr. 1934, Nr. 28.
G. Krohn, Zwei Heilungen von Lungenabzefßen mit Pulmothymol. Med. Klinik 1932, Nr. 33.
E. Schliephake, Die Ultra-Kurzwellen-Therapie. Med. Welt 1933, Nr. 20.
Hjaſchenko, Behandlung der Lungenabzefße mittels intratrachealer Einblasungen von Arzneilösungen. Mfchr. Ohrenheilk. 64.
Zentralblatt für innere Medizin 1931, S. 107: Referat Labbé, Spector, Fliederbaum; S. 1063: Referat Casparini, Merklen et Gounelle.
Zentralblatt für innere Medizin 1933, S. 271: Referat Landau et Kaminer; S. 651: Referat Bernard.

Lebenslauf.

Ich, Max Lagally, wurde am 7. November 1909 als Sohn des damaligen Reallehrers Dr. Max Lagally in München geboren. Nach 3jährigem Besuch der Volksschule trat ich 1919 zunächst in die Luitpold-Oberrealschule in München, ein Jahr später in das König-Georg-Gymnasium in Dresden ein, das ich Ostern 1928 mit dem Reifezeugnis verließ. An der Technischen Hochschule in Dresden studierte ich dann 3 Semester vorwiegend Mathematik und Naturwissenschaften, ging jedoch im Herbst 1929 nach Würzburg, um mich dem Studium der Medizin zu widmen. Das Physikum bestand ich dort im Frühjahr 1931. Ein Semester später siedelte ich an die Universität München über, wo ich mein Studium im Herbst 1933 mit dem medizinischen Staatsexamen abschloß.